



BAYER BUĞDAY ÇÖZÜMLERİ

FUNGİSİTLER

Bayer uzmanlığı ve teknolojisiyle buğday üreticilerine özel olarak geliştirilen modern fungusitler, buğday tarlalarında sıkça görülen ve üreticilerde verim kayıplarına neden olan fungal hastalıklarla mücadelede fark yaratıyor.



BUĞDAY ÇÖZÜMLERİMİZ

FUNGİSİTLER



HERBİSİTLER



TOHUM İLAÇLARI



DİJİTAL ÇÖZÜMLER



VARIANO® EC 400

Ürün Grubu: Fungisit

Etkili Madde: 100 g/L Prothioconazole +

250 g/L Spiroxamine + 50 g/L Bixafen

Formülasyon: EC (Emülsiyon konsantre)



Variano®
EC 400



BUĞDAYIN YEŞİLİ VERİMİN MÜJDECİSİ

Bayer tarafından geliştirilen modern fungusit teknolojisine sahip **Variano® EC 400**, içeriğinde bulunan 3 aktif maddenin mükemmel uyumu sayesinde buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğü, septorya ve külleme hastalıklarına karşı güçlü koruma sağlar. **Variano® EC 400** ile buğdayınız daha yeşil ve sağlıklı büyürken, sezon sonunda elde edeceğiniz verim ve kalite de yükseğe çıkar!

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday	Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>)	100 ml/da	35 gün
	Septorya Yaprak Leke Hastalığı (<i>Septoria tritici</i>)		
	Tahıl Külleme (<i>Erysiphe graminis f. sp. tritici</i>)		




Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü
(*Fusarium spp.*, *Rhizoctonia spp.*)



Septorya Yaprak Leke Hastalığı
(*Septoria tritici*)



Tahıl Külleme
(*Erysiphe graminis f. sp. tritici*)



Kardeşlenme Dönemi

Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü, Septorya Yaprak Lekesi, Tahıl Külleme

INPUT® EC 460

Ürün Grubu: Fungisit

Etkili Madde: 300 g/L Spiroxamine +
160 g/L Prothioconazole

Formülasyon: EC (Emülsiyon konsantre)



INPUT®
EC 460



INPUT® İLE FUNGAL HASTALIKLAR ARTIK ENGEL DEĞİL!

Buğdayın kritik fungal hastalıklarına karşı geliştirilen **Input® EC 460**, geniş etki spektrumuna sahip güçlü bir fungisittir. Ayrı kimyasal sınıflara ait ve etki şekilleri farklı olan iki aktif maddenin mükemmel uyumuna sahiptir. Hem koruyucu hem de tedavi edici etkisiyle öne çıkıyor!

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday, Arpa	Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>)	100 ml/da	35 gün
Buğday, Arpa	Septorya Yaprak Leke Hastalığı (<i>Septoria tritici</i>)		
Buğday	Tahıl Külleme (<i>Erysiphe graminis f. sp. tritici</i>)		
Arpa	Yaprak Yanıklığı (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		




Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü
(*Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp.)



Septorya Yaprak Leke Hastalığı
(*Septoria tritici*)



Tahıl Külleme
(*Erysiphe graminis* f. *sp. tritici*)



Kardeşlenme Dönemi

Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü, Septorya Yaprak Lekesi, Tahıl Külleme

CAYUNIS® EC 325

Ürün Grubu: Fungisit

Etkili Madde: 150 g/L Spiroxamine +
100 g/L Trifloxystrobin + 75 g/L Bixafen

Formülasyon: EC (Emülsiyon konsantre)



Cayunis®
EC 325



CAYUNIS® İLE EZBER BOZAN KORUMA!

Azole içermeyen 3 farklı aktif madde ve modern formülasyon teknolojisine sahip **Cayunis® EC 325**, geniş spektrumlu hastalık kontrolü sağlayarak; tahıl küllemesi, septorya yaprak lekesi ve sarı pas hastalıklarına karşı güçlü koruma sağlar. Uzun süreli yeşillendirme etkisine sahip olan **Cayunis® EC 325**, zorlu hava koşullarında bile verim kaybının önlenmesine destek olur.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday	Tahıl Küllemesi (<i>Erysiphe graminis</i>)	100 ml/da	49 gün
	Septorya yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>)		
	Sarı pas (<i>Puccinia striiformis</i>)		




Tahıl Külleme
(*Erysiphe graminis* f. sp. tritici)



Septorya Yaprak Leke Hastalığı
(*Septoria tritici*)



Sarı Pas
(*Puccinia striiformis*)



Sapa Kalkma ve Başak Dönemi
Tahıl Külleme , Septorya Yaprak Lekesi, Sarı Pas

SOLIGOR® EC 425

Ürün Grubu: Fungisit

Etkili Madde: 224 g/L Spiroxamine +
148 g/L Tebuconazole + 53 g/L Prothioconazole

Formülasyon: EC (Emülsiyon konsantre)



Soligor®
EC 425



HIZLI VE GÜÇLÜ ETKİSİYLE SOLIGOR® YANINIZDA!

Sapa kalkma döneminden başaklanma dönemine kadar kullanılabilen ve buğday yaprak hastalıklarını hızlı ve etkili şekilde kontrol altına alan

Soligor® EC 425, içerisinde bulunan sistemik özelliğe sahip 3 aktif sayesinde hem koruyucu hem de tedavi edici özelliğe sahiptir.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday	Septorya Yaprak Leke Hastalığı (<i>Septoria tritici</i>)	80 ml/da	49 gün
	Tahıl Külleme (<i>Erysiphe graminis f. sp. tritici</i>)		
	Sarı Pas (<i>Puccinia striiformis</i>)		
	Kahverengi Pas (<i>Puccinia recondita tritici</i>)		




Septorya Yaprak Leke Hastalığı
(*Septoria tritici*)

Tahıl Külleme
(*Erysiphe graminis f. sp. tritici*)

Sarı Pas
(*Puccinia striiformis*)

Kahverengi Pas
(*Puccinia recondita tritici*)



Sapa Kalma

Septorya Yaprak Lekesi, Tahıl Külleme, Pas Hastalıkları

PROSARO® EC 250

Ürün Grubu: Fungisit

Etkili Madde: 125 g/L Prothioconazole +
125 g/L Tebuconazole

Formülasyon: EC (Emülsiyon konsantre)



PROSARO®
EC 250



PROSARO® HER ZAMAN YANINIZDA

Buğday tarlalarında sıklıkla görülen sarı pas, kahverengi pas, başak yanıklığı, külleme ve septorya yaprak lekesi hastalıkları, **Prosaro® EC 250** ile son buluyor! Buğdayın bayrak yaprak ve başak döneminin ideal fungisiti olan **Prosaro® EC 250**, güçlü etkisi sayesinde yalnızca buğdayı hastalıklardan korumakla kalmıyor, daha yeşil ve sağlıklı görünmesine de katkı sunuyor.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Buğday	Sarı Pas (<i>Puccinia striiformis</i>)	100 ml/da	35 gün
	Kahverengi Pas (<i>Puccinia recondita tritici</i>)		
	Başak Yanıklığı (<i>Fusarium graminearum</i> , <i>F. culmorum</i>)		
	Tahıl Külleme (<i>Erysiphe graminis f. sp. tritici</i>)		
	Septorya Yaprak Leke Hastalığı (<i>Septoria tritici</i>)		



Sarı Pas
(*Puccinia striiformis*)




Başak Yanıklığı
(*Fusarium graminearum*,
F. culmorum)



Tahıl Külleme
(*Erysiphe graminis* f. sp. *tritici*)



Septorya Yaprak Leke Hastalığı
(*Septoria tritici*)



Sapa Kalma

Erken Pas, Tahıl Külleme, Septorya Yaprak Leke Hastalığı

KELT® WG 85

Ürün Grubu: Herbisit

Etkili Madde: %85 Pyroxasulfone

Formülasyon: WG (Suda dağılabilen granül)



ERKEN ÖNLEM AL, KELT® İLE VERİMİNİ ARTTIR

Buğday yetiştiricilerinin en önemli sorunlarının başında yabancı otlar geliyor. Bayer'in güçlü toprak herbisiti **Kelt® WG 85** ile bu sorun çözüme kavuşuyor. Dirençli dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı yüksek etki gösteren **Kelt® WG 85**, buğday tarlalarında yabancı ot sorununu ortadan kaldırarak yüksek verim sağlıyor.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu	Uygulama Zamanı
Buğday*	Tilki Kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Tarla Köpek Papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) Kısır Yabani Yulaf (<i>Avena Sterilis</i>) Dil kanatan (<i>Galium aparine</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) İnce delice (<i>Lolium rigidum</i>) Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Çayır Salkım Otu (<i>Poa pratensis</i>) Bülbül otu (<i>Sisymbrium officinale</i>) Yavşan otu (<i>Veronica spp.</i>)	15 g/da	Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde
Buğday*	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) İnce delice (<i>Lolium rigidum</i>)	15 g/da	Buğdayın 1-2 yapraklı döneminde ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde

* Ekmeklik buğday



Karaçim
(*Lolium rigidum*)



Yabani Yulaf
(*Avena sterilis*)




Tilki Kuyruğu
(*Alopecurus myosuroides*)



Yavşan Otu
(*Veronica spp.*)



Hakiki Papatya
(*Matricaria chamomilla*)



Ekim ve Erken Çıkış Dönemi
Yabancı Otların Çıkışı Öncesi (Pre-em)


ANTHOLOGY® WG

Ürün Grubu: Herbisit

Etkili Madde: %4.5 Mesosulfuron-methyl +
%1.5 Thiencarbazone-methyl +

%0.9 Iodosulfuron-methyl + %13.5 Mefenpyr-diethyl

Formülasyon: WG (Suda dağılabilen granül)



ANTHOLOGY® WG ETKİSİYLE BUĞDAYINIZ GÜVENDE

Hububat herbisitlerinde Bayer tecrübesinin son ürünü olan **Anthology® WG**, buğday tarlalarında sorun olan dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı geliştirilmiş yeni ve güçlü yabancı ot çözümüdür. İçeriğinde bulunan üç aktif madde uyumu ile yüksek performansa sahiptir.



KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu	Uygulama Zamanı
Buğday	Yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	25 g/da+100 ml Biopower*	Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların 2-6 yapraklı aktif gelişim dönemlerinde uygulanır.
	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)		
	Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>)		
	Kısa başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>)		
	Adi fiğ (<i>Vicia sativa</i>)		
	Rüzgar otu (<i>Apera spica-venti</i>)	30 g/da+100 ml Biopower*	
	Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>)		
	Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)		
	Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>)		
	Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)		
	Düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>)		
	Yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>)		

* Biopower yayıcı-yapıştırıcıdır. Yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka **Anthology® WG** ile birlikte kullanılmalıdır. Dirençli yabani hardal varsa Buctril gibi hormon terkibli bir herbisit ile karıştırılarak kullanılabilir.



Yabani Yulaf
(*Avena sterilis*)


Hakiki şahtere
(*Fumaria officinalis*)

Tilki Kuyruğu
(*Alopecurus myosuroides*)

T. Köpek Papatyası
(*Anthemis arvensis*)

Dilkanatan
(*Galium aparine*)

Şahtere
(*Fumaria officinalis*)



Kardeşlenme

Yabancı Otların Çıkışı Sonrası (Post-em)

SIGMA® OD 120

Ürün Grubu: Herbisit

Etkili Madde: 30 g/L Mesosulfuron-methyl +
90 g/L Mefenpyr-diethyl

Formülasyon: OD (Yağ bazlı süspansiyon konsantre)



YABANCI OTLARIN DİRENCİ SIGMA® İLE KIRILDI

Güçlü, hızlı ve sistemik etkisiyle **Sigma® OD 120**, buğday tarlalarında görülen önemli dar yapraklı yabancı otlara karşı başarılı performans sergiler. Buğdaya son derece güvenli olan **Sigma® OD 120** ile özellikle dirençli yabancı otlarla mücadele etmek kolaylaşır.



KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu	Uygulama Zamanı
Buğday	Kısır Yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	40 ml / da + 100 ml Biopower*	Buğdayın ve yabancı otların aktif gelişim (kardeşlenme) döneminde uygulanır
	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)		
	İtalyan çimi (<i>Lolium multiflorum</i>)		
	Kısa başaklı kuş yemi (<i>Phalaris brachystachys</i>)		

* Biopower yayıcı-yapıştırıcıdır.
Yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka **Sigma® OD 120** ile birlikte kullanılmalıdır.



Kısır Yabani Yulaf
(*Avena sterilis*)




Tilki Kuyruğu
(*Alopecurus myosuroides*)



İtalyan Çimi
(*Lolium multiflorum*)



Kuş Otu
(*Phalaris brachystachys*)



Kardeşlenme
Yabancı Otların Çıkışı Sonrası (Post-em)

ATTRIBUT® SUPER WG 20

Ürün Grubu: Herbisit

Etkili Madde: %6.75 Propoxycarbazone-sodium +
%4.5 Mesosulfuron-methyl + %9 Mefenpyr-diethyl

Formülasyon: WG (Suda dağılabilen granül)



ATTRIBUT®
super
WG 20



ATTRIBUT® SUPER İLE KONTROL ELİNİZDE

Buğdayla rekabete girerek bitki gelişimini olumsuz etkileyen yabancı otlara karşı **Attribut® Super WG 20** ile kontrol artık üreticilerin elinde. Buğdayda yıllardır dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan FOP grubu herbisitlerden daha farklı etki mekanizması ile Brom otu başta olmak üzere birçok dar yapraklı yabancı ot sorun olmaktan çıkıyor.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu	Uygulama Zamanı
Buğday	Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>)	30 ml/da + 100 ml Biopower*	Buğday ve yabancı otların aktif gelişim (kardeşlenme) döneminde uygulanır
	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	20 ml/da + 100 ml Biopower*	
	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	20 ml/da + 100 ml Biopower*	
	İtalyan çimi (<i>Lolium multiflorum</i>)	25 ml/da + 100 ml Biopower*	
	Kısa başaklı kuş yemi (<i>Phalaris brachystachys</i>)	20 ml/da + 100 ml Biopower*	

* Biopower yayıcı-yapıştırıcıdır. Yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka **ATTRIBUT® SUPER WG 20** ile birlikte kullanılmalıdır.



Püsküllü Çayır
(*Bromus tectorum*)




Tilki Kuyruğu
(*Alopecurus myosuroides*)



Kısır Yabani Yulaf
(*Avena sterilis*)



İtalyan Çimi
(*Lolium multiflorum*)



Kardeşlenme

Yabancı Otların Çıkışı Sonrası (Post-em)

RAXIL® DS 2

Ürün Grubu: Tohum İlacı
Etkili Madde: %2 Tebuconazole
Formülasyon: DS (Kuru tohum ilacı)



Raxil®
2 DS



TOHUM HASTALIKLARINA KARŞI ÜSTÜN KORUMA

Buğdayda tohumdan bulaşan birçok önemli hastalığa karşı güçlü koruma sağlayan **Raxil® DS 2**, sahip olduğu sistemik etki sayesinde yalnızca tohumun dış yüzeyindeki değil, tohum içindeki hastalık etmenlerine karşı da etki gösterir. Üstün boyama, yayılma, yapışma özelliği ve doğa dostu oluşuyla buğday üreticilerine daha sezon başında güvence sağlar.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR


Bitki Adı	Hastalık Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Buğday	Sürme (<i>Tilletia spp.</i>)	150 g / 100 kg tohum
	Açık Rastık (<i>Ustilago nuda tritici</i>)	



Sürme (*Tilletia* spp.)



Açıık Rastık (*Ustilago nuda tritici*)





CLIMATE
FIELDVIEW™



KARARLARINIZI VERİLERLE DESTEKLEYİN

Climate FieldView™ veriye dayalı, kapsamlı bir dijital tarım çözümüdür. Önemli kararlarınızı verilerle desteklemenizi sağlar. Ayrıca sorunları erkenden görüp zamanında müdahale etmenize olanak tanır.

Climate FieldView™ sezon boyunca size nasıl yol gösterir?

- // Tarla Sağlığı Haritaları ile ürün gelişimini takip etme
- // Bitki Örtüsü Haritaları ile hasat için en iyi zamanı belirleme
- // Gübre yönetiminizi optimize etme
- // Ürün Su Kullanımı Haritası ile mahsullerinizin su tüketimini takip ve sulama programınızı optimize etme



TARLANIZDAKİ HASTALIK VE YABANCI OTLARI SANİYELER İÇİNDE TEŞHİS EDİN!

MagicScout, mobil cihazınızın kamerası ile tarlanızdaki hastalık ve yabancı otları hızlı bir şekilde teşhis etmenize olanak sağlayan ücretsiz bir mobil uygulamadır.

// **Sorunları tanımlayın:** Entegre görüntü tanıma ile yabancı otları ve hastalıkları hızlı ve kolay bir şekilde teşhis edebilirsiniz. Üstelik internet bağlantısına ihtiyaç duymadan.

// **Hava durumu:** Agriweather 2.0 ile artık ürünlerinizin nasıl geliştiğini ve onları neyin strese soktuğunu daha iyi anlayabilirsiniz.

// **Tarla profili oluşturma:** MagicScout tarlanız için bir profil oluşturur. Böylece tarlanızla ilgili kayıtlı bilgilere sahip olursunuz.

// **FieldView entegrasyonu:** MagicScout'u, FieldView ile entegre edebilir, iki uygulama arasında veri akışı sağlayabilirsiniz.



Yabancı Ot



Hastalık



BUĞDAY ÇÖZÜMLERİMİZ

FUNGİSİTLER



HERBİSİTLER



TOHUM İLAÇLARI



DİJİTAL ÇÖZÜMLER



HERBİSİTLER

Buğday tarlalarında verim kayıplarına neden olan dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı Bayer tarafından geliştirilen modern herbisitler; buğdayın daha sağlıklı büyümesine ve üreticilerin verimini ve kazancını arttırmasına katkı sunuyor.

Uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka ürün etiketini ve ürün bilgilerini okuyunuz.



Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53

Ümraniye 34770 İSTANBUL

Telefon : 0216 / 528 36 00

Faks : 0216 / 528 38 68

www.cropscience.bayer.com.tr

Zehirlenme halinde başvurunuz.



Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114

Bütün Zirai mücadele problemlerinizi için
firmamıza başvurabilirsiniz.

Bayer TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD üyesidir.



Herkes Yararlanmalı
Google play



Herkes Yararlanmalı
App Store